• 研究报告 •

地塞米松对大鼠脑水通道蛋白 4 表达的影响

李慧 陈圣刚 陈吉相

【关键词】 脑出血; 地塞米松; 水通道蛋白 4; 血脑屏障; 脑水肿

脑出血在临床上有极高的病死率, 主要死因为大脑水肿后引起颅内压增高导致脑疝, 因此, 及时治疗脑水肿对降低脑出血病死率有重要意义。目前许多研究表明, 水通道蛋白 4 (AQP-4) 与脑水肿的发生发展密切相关, 脑出血后周围水肿区的 AQP-4 蛋白表达增加, 3 d 达到高峰后逐渐下降^[1]。而临床上用糖皮质激素(GC)治疗脑水肿一直存在争议。本实验通过缓慢输注自体血建立脑出血模型, 比较地塞米松治疗后水肿周围水肿区脑含水量、血脑屏障(BBB)通透性及 AQP-4 表达的变化, 以期 GC 治疗脑水肿提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试剂与器材: 胶原酶 VII (Sigma 公司), 免疫组化过氧化物酶标记的链霉卵白素法(SP)试剂盒(美国 Zymed 公司), 鼠抗 AQP-4 多克隆抗体(武汉博士得公司), 3, 3'-二氨基联苯胺(DAB)试剂盒(北京中杉金桥生物技术有限公司); 立体定向仪(西安西北光电仪器厂), 微量进样器(上海高欣玻璃仪器厂)。

1.2 实验动物及分组: 雄性成年 Wistar 大鼠 70 只, 体重 250~350 g, 由华中科技大学同济医学院实验动物中心提供。采用随机数字表法分为假手术组(尾状核注射 50 μ l 生理盐水, $n=10$)、脑出血组(尾状核注射 50 μ l 自体血, $n=30$)和地塞米松组(地塞米松干预脑出血模型大鼠, $n=30$)。脑出血组和地塞米松组每

组再分成脑出血后 6 h、12 h 及 1、3、5 和 7 d 组, 每组 5 只。

1.3 脑出血模型制备方法^[2]: 用体积分数为 10% 的水合氯醛(3 g/kg)腹腔注射麻醉大鼠后, 将大鼠俯卧位固定在立体定向仪上, 头皮正中切口约 2 cm, 剪开骨膜, 暴露前囟及冠状缝, 于前囟旁开 3.0 mm、前 0.2 mm 处钻孔, 孔径约为 1.0 mm, 将微量(100 μ l)进样器固定在立体定向仪上, 针尖对准颅孔, 缓慢注射胶原酶 VII 1 U, 脑内进针 5.5 mm, 该部位为尾状核位置, 留针 15 min 防止血液回流, 缓慢起针, 骨蜡封颅孔, 缝合头部及尾部伤口, 单笼饲养。地塞米松组大鼠脑出血后腹腔注射地塞米松 10 mg/kg, 每日 2 次; 脑出血组腹腔注射生理盐水 2 ml/kg, 每日 2 次。

1.4 脑含水量的测定: 各时间点处死动物后断头取脑, 以针道为中心取 4 mm 厚的脑组织, 称取湿重(W)后放入烤箱(100 $^{\circ}$ C)干烤, 24 h 后取出称干重(D), 按照下列公式计算脑含水量。

$$\text{脑含水量}(\%) = (W - D) / W \times 100\%$$

1.5 BBB 通透性的测定: 10% 水合氯醛(3 g/kg)腹腔注射麻醉大鼠后, 经尾静脉注射质量分数为 2% 的伊文思蓝(EB, 4 ml/kg), 大鼠眼球结膜、四肢变蓝表示注入成功。1 h 后, 心脏灌注生理盐水 100 ml, 断头取脑, 取水肿周围脑组织约 300~500 mg, 称重, 放入 10 ml/kg 甲酰胺中, 60 $^{\circ}$ C 恒温水浴 24 h。将浸泡过的

脑组织先用甲酰胺过滤, 在分光光度计($\lambda=632$ nm)上测定吸光度(A)值, 根据 EB 标准曲线计算脑组织中 EB 含量。

1.6 AQP-4 的免疫组化检测及图像分析: 麻醉大鼠, 用体积分数为 4% 的多聚甲醛心脏灌注成功后断头取脑, 以针道为中心, 冠状切下约 2 mm 厚的脑组织块, 固定 8 h 后, 石蜡包埋、切片, 片厚 7 μ m, 切片脱蜡至水, 用体积分数为 3% 的 H₂O₂ 室温下孵育 5~10 min, 消除内源性过氧化物酶活性, 正常山羊血清封闭 10 min, 滴加 AQP-4 多克隆抗体(1:200), 37 $^{\circ}$ C 孵育 3 h, 按照 SP 试剂盒说明书进行操作, DAB 显色。阴性对照组用 0.01 mol/L 磷酸盐缓冲液(PBS)替代一抗。用 Imge-Pro Plus 图像分析软件进行图像分析, 分析指标为 A 值。

1.7 统计学方法: 采用 SPSS12.0 统计软件进行处理, 数据以均数 $\pm$ 标准差($\bar{x}\pm s$)表示, 组内比较采用单因素方差分析, 组间比较采用 t 检验, $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 水肿周围脑含水量的变化(表 1): 脑出血组脑含水量随时间逐渐增高, 至 3 d 达高峰, 后逐渐下降, 可持续 7 d 以上; 地塞米松组脑含水量亦逐渐增高至 3 d, 1~5 d 地塞米松组脑含水量显著低于脑出血组(P 均 <0.05)。

2.2 BBB 通透性的变化(表 1): 脑出血组 BBB 通透性在 1 d 内显著增高后缓慢

表 1 两组不同时间点脑含水量、BBB 通透性及 AQP-4 蛋白表达的比较($\bar{x}\pm s, n=5$)

指标	组别	6 h	12 h	1 d	3 d	5 d	7 d
脑含水量(%)	脑出血组	79.81 $\pm$ 0.23	81.12 $\pm$ 0.53	82.52 $\pm$ 0.41	83.63 $\pm$ 0.31	81.34 $\pm$ 0.45	80.26 $\pm$ 0.35
	地塞米松组	79.22 $\pm$ 0.53	80.99 $\pm$ 0.31	81.15 $\pm$ 0.42*	82.30 $\pm$ 0.49*	79.66 $\pm$ 0.17*	78.89 $\pm$ 0.52
BBB 通透性(μ g/g)	脑出血组	6.56 $\pm$ 0.69	8.35 $\pm$ 0.27	11.59 $\pm$ 0.55	10.53 $\pm$ 0.46	8.57 $\pm$ 0.39	6.87 $\pm$ 0.24
	地塞米松组	6.91 $\pm$ 0.37	8.30 $\pm$ 0.49*	11.23 $\pm$ 0.49*	9.87 $\pm$ 0.84**	8.10 $\pm$ 0.63*	6.81 $\pm$ 0.54
AQP-4 蛋白(A 值)	脑出血组	0.24 $\pm$ 0.06	0.30 $\pm$ 0.06	0.37 $\pm$ 0.04	0.52 $\pm$ 0.09	0.43 $\pm$ 0.04	0.34 $\pm$ 0.06
	地塞米松组	0.22 $\pm$ 0.04	0.26 $\pm$ 0.03*	0.33 $\pm$ 0.05*	0.44 $\pm$ 0.06**	0.35 $\pm$ 0.02*	0.20 $\pm$ 0.01**

注: 假手术组脑含水量(76.69 $\pm$ 0.48)%, BBB 通透性(6.42 $\pm$ 0.51) μ g/g, AQP-4 蛋白 0.23 $\pm$ 0.05; 与脑出血组比较: * $P<0.05$,

** $P<0.01$

基金项目: 湖北省科技基金资助项目(2004AA301C97)

作者单位: 430022 湖北武汉, 华中科技大学同济医学院附属协和医院神经内科

作者简介: 李慧(1982-), 女(汉族), 湖北省人, 硕士研究生, 主要研究方向为脑出血后脑水肿(Email: helikezai@163.com)。

下降,7 d 后仍未达到正常水平;地塞米松组 12 h~5 d BBB 通透性均显著低于脑出血组($P < 0.05$ 或 $P < 0.01$)。

2.3 血肿周围 AQP-4 蛋白的表达(表 1):AQP-4 在星形胶质细胞膜上表达,以脑室上皮细胞、软膜上皮细胞较为显著(彩色插页图 1 显示,地塞米松组治疗 1 d 时 AQP-4 免疫组化染色阳性细胞呈棕色,表明侧脑室的室管膜上皮细胞上 AQP-4 大量表达);在血肿周围水肿区域亦存在 AQP-4 的大量表达(彩色插页图 2 显示,地塞米松组 12 h 时 AQP-4 免疫组化染色阳性细胞呈棕色,血肿周围水肿区有大量 AQP-4 表达)。脑出血后 AQP-4 表达显著增强,3 d 达高峰,地塞米松治疗后 3 d 的峰值较脑出血组显著降低($P < 0.01$)。

3 讨论

AQP-4 在脑组织中含量很高,主要分布在星形胶质细胞、室管膜上皮细胞及软膜上皮细胞,视上核、视旁核也有分布,属于汞不敏感 AQP。近年来越来越多的研究表明,AQP-4 在脑水肿发生发展中起重要作用,Taniguchi 等^[2]在脑梗死后脑水肿的研究中发现,梗死区周围 AQP-4 表达上调,3 d 后达高峰,可持续 7 d 以上,该变化与磁共振成像(MRI)显示的脑水肿形成和消散结果一致,提示 AQP-4 与缺血后脑水肿形成密切相关。Manley 等^[3]用 AQP-4 基因敲除小鼠进行急性水中毒实验,发现 AQP-4^{-/-}小鼠脑含水量减轻,神经功能缺损程度也减轻,而且成活率高于 AQP-4^{+/+}小鼠。又有 Vajda 等^[4]用肌营养不良小鼠进行水中毒实验,发现肌营养不良小鼠的脑水肿形成延缓,推测是由于小鼠缺乏肌营养不良蛋白(dystrophin),使得 AQP-4 不能正确极化定位于星形胶质细胞,导致由该通道进入细胞的水分减少,从而延缓了脑水肿的发生。Sun 等^[5]在创伤后脑水肿研究中发现,自由落体致脑损伤模型大鼠损伤区肿胀的星形胶质细胞上 AQP-4 明显上调,在周边临近区域下调,远处无明显变化,说明 AQP-4 参与了各种原因引起的脑水肿的形成。

Marios 等^[6]研究认为,AQP-4 在血管源性脑水肿和细胞毒性脑水肿中的作用机制并不相同。在血管源性脑水肿中,AQP-4 介导水分子的跨膜转运(由脑实质转运入血管)能清除水分;在细胞

毒性脑水肿中,AQP-4 能促进脑水肿的形成,早期使用 AQP-4 抑制剂能减缓水分进入脑实质,但是一旦发展到以血管源性脑水肿为主时,使用 AQP-4 抑制剂会减少水肿清除。由于 AQP-4 的特殊分布(主要分布在星形胶质细胞与血液及脑脊液的交界面),其参与了 BBB 的形成。BBB 的完整性与 AQP-4 表达密切相关。Tomas-Camardiel 等^[7]在脑肿瘤的研究中发现,随着 BBB 的破坏,AQP-4 表达上调,考虑 BBB 破坏是导致 AQP-4 增加的原因。Vizuete 等^[8]在脑机械损伤或向纹状体注射喹啉酸(即天冬氨酸受体激动剂)的研究结果显示,AQP-4 mRNA 的表达与神经元损伤不相关,而与 BBB 的损伤有关。

GC 通过结合于细胞内的糖皮质激素受体(GR),形成复合物进入细胞核内,作用于 DNA 的糖皮质激素反应元件(GRE)调节基因的表达,Moon 等^[9]在研究红白血病(MEL)细胞时发现,MEL 细胞的 AQP-1 启动子区域存在 GRE。同时 Tanaka 等^[10]在气道上皮细胞 AQP-3 启动子区域发现皮质类固醇的 GRE,但是未见 GRE 存在于 AQP-4 启动子上的报道。

GC 在临床上用来治疗脑出血后脑水肿一直存在争议。本实验用 GC 治疗脑出血后脑水肿大鼠发现:随着 GC 治疗时间的延长,其减轻脑水肿的作用越为显著;同时,GC 在一定程度上保护了 BBB 免受血肿周围各种毒性因子的损伤,从出血后 1 d 起,BBB 的通透性均较脑出血组低;在 AQP-4 蛋白表达上,早期改变不明显,中晚期 AQP-4 蛋白表达较脑出血组增加。原因可能是在脑出血后脑水肿形成中,早期为血肿周围缺血、缺氧及血肿毒性物质释放引起的细胞毒性脑水肿,中晚期为血管源性脑水肿,是血肿毒性物质破坏了 BBB,导致水分子由血管内渗出到脑实质。我们认为,地塞米松通过降低 BBB 通透性,增加 AQP-4 表达,从而达到治疗血管源性脑水肿的目的。但是,究竟 GC 是直接上调 AQP-4 表达还是通过保护 BBB 从而间接上调 AQP-4 表达,有待进一步研究。假设 GC 能直接上调 AQP-4 表达,由于 GC 调节基因途径众多,GC 包括介导的基因效应、非基因的受体介导效应、非基因的生化效应等,究竟是哪条通路起作用仍不很清楚。而且星形胶质

细胞的 AQP-4 基因启动子区域是否存在 GRE,还无明确答案。如果 GC 是通过保护 BBB 来改变 AQP-4 表达,AQP-4 与 BBB 完整性的关系仍有待进一步研究。

参考文献:

- 1 李燕华,孙善全.大鼠出血性脑水肿水通道蛋白 4 表达的研究[J].中国危重病急救医学,2003,15(9):538-541.
- 2 Taniguchi M, Yamashita T, Kumura E, et al. Induction of aquaporin - 4 water channel mRNA after focal cerebral ischemia in rat[J]. Brain Res Mol Brain Res, 2000,78(1-2):131-137.
- 3 Manley G T, Fujimura M, Ma T, et al. Aquaporin - 4 deletion in mice reduces brain edema after acute water intoxication and ischemic stroke[J]. Nat Med, 2000, 6(2):159-163.
- 4 Vajda Z, Pedersen M, Fuchtbauer E M, et al. Delayed onset of brain edema and mislocalization of aquaporin - 4 in dystrophin - null transgenic mice [J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2002, 99(20): 13131-13136.
- 5 Sun M C, Honey C R, Berk C, et al. Regulation of aquaporin - 4 in a traumatic brain injury model in rats [J]. J Neurosurg, 2003, 98(3):565-569.
- 6 Marios C, Papadopoulos, Geoffrey T, et al. Aquaporin - 4 facilitates reabsorption of excess fluid in vasogenic brain edema[J]. Faseb J, 2004, 7(18):1096-1114.
- 7 Tomas-Camardiel M, Venero J L, Herrera A J, et al. Blood - brain barrier disruption highly induce aquaporin - 4 mRNA and protein in perivascular and parenchymal astrocytes; protective effect by estradiol treatment in ovariectomized animals[J]. J Neurosci Res, 2005, 80(2):235-246.
- 8 Vizuete M L, Venero J L, Vargas C, et al. Differential upregulation of aquaporin - 4 mRNA expression in reactive astrocytes after brain injury; potential role in brain edema [J]. Neurobiol Dis, 1999, 6(4): 245-258.
- 9 Moon C, King L S, Agre P. Aqp1 expression in erythroleukemia cells; genetic regulation of glucocorticoid and chemical induction[J]. Am J Physiol, 1997, 273(5 Pt 1):C1562-C1570.
- 10 Tanaka M, Inase N, Fushimi K, et al. Induction of aquaporin 3 by corticosteroid in a human airway epithelial cell line [J]. Am J Physiol, 1997, 273(5 Pt 1): L1090-1095.

(收稿日期:2007-01-08)

(本文编辑:李银平)

脑外伤后大鼠脊髓内去甲肾上腺素能神经元变化的研究

(正文见349页)

A: 正常对照组脊髓前角; B、C、D: 脑外伤组伤后24 h脊髓前角、侧角、后角; 箭头示DBH阳性神经元胞体

图1 脑外伤24 h后大鼠脊髓内DBH阳性神经元表达(免疫组化, ×400)

Figure 1 DBH-positive expression neurons in spinal cord of rats at 24 hours after brain injury (immunohistochemistry, ×400)

肾上腺髓质素对局灶性脑缺血/再灌注损伤大鼠神经元凋亡及早期生长反应基因-1的影响

(正文见353页)

A: 假手术组; B: I/R损伤组; C: ADM股静脉组; D: ADM颈内动脉组; E: ADM侧脑室组; 1为脑皮质, 2为海马CA1区

图1 各组大鼠脑皮质及海马CA1区神经元凋亡情况(TUNEL, ×400)

Figure 1 Apoptosis of neurons in cerebral cortex and hippocampus CA1 zone of rats in each group (TUNEL, ×400)

A: 假手术组; B: I/R损伤组; C: ADM股静脉组; D: ADM颈内动脉组; E: ADM侧脑室组

图2 各组大鼠脑组织Egr-1 mRNA表达(DAB, ×400)

Figure 2 Expression of Egr-1 mRNA in brain tissues of rats in each group (DAB, ×400)

地塞米松对大鼠脑水通道蛋白4表达的影响

(正文见369页)

图1 地塞米松组治疗1 d时AQP-4阳性表达(免疫组化, ×200)

Figure 1 Positive expression of AQP-4 on 1 day after treatment in dexamethasone group (immunohistochemistry, ×200)

图2 地塞米松组治疗12 h时AQP-4阳性表达(免疫组化, ×400)

Figure 2 Positive expression of AQP-4 at 12 hours after treatment in dexamethasone group (immunohistochemistry, ×400)

74=21