

[J]. 中国中西医结合杂志, 2000, 20(4): 296-297.

28-29.

[17] 陈文强, 李宗信, 黄小波, 等. 导痰汤对大鼠脑血管内皮细胞 ICAM-1 影响的研究[J]. 中国中医药信息杂志, 2008, 15(1):

(收稿日期: 2008-09-30 修回日期: 2008-10-19)

(本文编辑: 李银平)

· 名医经验谈 ·

李可老中医治疗肿瘤的学术经验

俞凤英

(浙江省湖州市中医院, 浙江 湖州 313000)

【关键词】 肿瘤; 中医治疗学; 名医经验

中图分类号: R242 文献标识码: B DOI: 10.3969/j.issn.1008-9691.2009.01.004

李可, 1933 年生, 山西人。致力于中医临床实践 50 余年。对仲景学说极其推崇, 倡导“难症痼疾, 师法仲景”, 认为“仲景方能治大病, 救急痛, 愈痼疾, 是攻克疑难大症的仙丹妙药”。擅长应用附子、乌头类峻猛药物救治危重急症疑难病, 为当今山西乃至全国的名医, 被著名中医大家邓铁涛先生誉为“中医的脊梁”。《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》是李老一生经验的总结, 内容丰富, 颇有独到见解。本人深入学习, 现就其治疗肿瘤的特色和学术主张做一初步探讨。

1 权衡邪正关系 调整攻补比例

肿瘤患者, 多是局部属实而整体属虚, 虚实夹杂, 治疗中不可只见局部、不见整体, 所以在肿瘤的论治中, 应当根据临床表现, 权衡邪正关系, 辨证运用攻补两法。故李老认为, 晚期患者, 大多邪实正虚, 运用自拟的攻癌夺命汤, 当调整攻补比例。癌毒炽盛, 危及生命, 攻邪为先; 奄奄一息, 无实可攻, 但扶其正。攻与补皆为调动人体自身抗癌潜能, 攻法运用得当, 可以扫荡癌毒凶焰, 拨乱反正, 邪去则正安。补法运用得当, 可增强人体免疫功能, 养正积自消。李老的医案中就有四处关于根据邪实正虚调整攻补比例的记录, 治疗过程中始终以患者邪正虚实而调整治则, 充分体现了辨证论治的原则性和灵活性, 值得学习。李老认为, 对于晚期癌症患者, 宜着眼整体, 抱定“扶正邪自退, 养正积自消”的宗旨, 以补为主。治癌是持久战, 正胜邪却, 暂时的缓解, 瘤体消失, 不等于癌毒彻底消灭。

作者简介: 俞凤英 (1953-), 女 (汉族), 浙江省人, 副主任中医师, Email: yufengying@foxmail.com.

2 创立有效验方——攻癌夺命汤

李老在数十年的实践探索中, 经不断完善, 创立了抗癌效方——攻癌夺命汤。经临床运用 40 年, 治疗多种恶性肿瘤, 竟获奇效。方由漂海藻、生甘草、木鳖子、醋鳖甲、白花蛇舌草、夏枯草、蚤休、海蛤壳、黄药子、生半夏、鲜生姜、玄参、牡蛎各 30 g, 大贝 15 g, 山茨菇、山豆根各 10 g, 另全蝎 12 只, 蜈蚣 4 条, 明雄黄 1 g (研粉吞服), 共 19 味药组成。该方攻癌解毒、软坚散结、涤痰消癥, 以治疗恶性肿瘤中属于实证者为主, 有一举扫灭癌毒凶焰、夺回患者生命之效, 故取名攻癌夺命汤。

方中海藻, 为消瘤专药, 用时清水漂洗去盐。味咸性寒, 入肺、脾、肾经。本品能软坚散结, 泻热消水 (包括癌性渗出物), 主治瘰疬、瘰癧、积聚、水肿; 与甘草同用, 相反相激, 增强涤荡磨积、攻坚化瘤之力。木鳖子味苦寒, 有毒, 为消积块破肿毒要药。方中生半夏, 为消痰核、化瘤散结要药, 可止各种剧烈呕吐。仲景方中半夏皆生用, 今以等量的鲜生姜制其毒, 加强止呕功效, 更无中毒之虞。方中白花蛇舌草、蚤休为治毒蛇咬伤要药, 专治恶毒疮疖, 善解血分诸毒。山茨菇、山豆根、黄药子皆经近代筛选之抗癌要药。海蛤壳与浮海石相近, 最善化痰软坚, 清热泻火, 养阴利水, 为治瘰疬、积聚要药。夏枯草清肝散结, 主治瘰疬、瘰癧、癥积、乳癌、宫颈癌之崩漏下血、肺结核大咯血, 兼有补益血脉功用。醋鳖甲为《金匱要略》鳖甲煎丸主药, 与消瘰丸相合, 大大增强了养阴化痰、软坚破积之力。明雄黄为历代辟秽防疫解毒要药, 为古方犀黄丸、醒消丸要药, 对癌毒扩散深入血

分、血液中毒, 有清除之效。综之, 本方以海藻、甘草相反相激, 木鳖子、生半夏、雄黄以毒攻毒, 合大贝攻癌破坚, 清热解聚, 化痰散结之品为君, 以鳖甲、消瘰丸养阴扶正为臣, 以活血化痰虫类搜剔引入血络为佐使, 直捣病巢, 力专效宏。

对辨证属痰核、痰毒, 痰瘀互结, 热毒炽盛, 毒入血分, 全身中毒症状严重之多种恶性肿瘤, 经过化裁, 可泛应曲当, 近期疗效满意, 尤对头颈部、淋巴系统、消化道肿瘤有特效。但该方毕竟是以攻邪为主, 对于晚期患者, 当调整攻补比例。攻邪勿伤正, 本方大贝苦寒之品, 脾胃怯弱者, 可小其剂, 并以肉桂温热灵动之品反佐, 以保护脾胃为第一要义。李老根据经验告诫我们: 应用本方后症状暂时缓解、瘤体消失, 并不等于癌毒彻底消灭, 一旦人体正气有亏, 癌毒又成燎原之势, 即取得近期疗效后, 仍要攻补兼施, 辨证治疗, 以冀彻底消除癌毒, 杜绝复发转移。

3 重视情志因素, 指导临床治疗

李老对于女性生殖系统肿瘤如宫颈癌的治疗颇多心得, 认为除了多种原因引起八脉损伤, 累及肝、脾、肾, 元气先虚等基本病因外, 患者多属性格内向类型, 或久处逆境, 忧思郁怒, 五志过激化火, 湿热积久成毒, 气滞血瘀, 结于胞宫而病成。所以“气郁”不仅是本病形成的重要因素, 又可左右本病进程, 故“解郁”便成为治疗本病的重要手段。解郁之法, 单靠药物是不行的, 在治疗中十分重视运用“五志相胜”的精神疗法, 使治疗进展事半功倍。基础方则选用逍遥散化裁, 以疏肝解郁。

(收稿日期: 2008-10-18)

(本文编辑: 李银平)

作者：[俞凤英](#)
作者单位：[浙江省湖州市中医院, 浙江, 湖州, 313000](#)
刊名：[中国中西医结合急救杂志](#) [ISTIC](#) [PKU](#)
英文刊名：[CHINESE JOURNAL OF INTEGRATED TRADITIONAL AND WESTERN MEDICINE IN INTENSIVE AND CRITICAL CARE](#)
年, 卷(期)：2009, 16(1)
被引用次数：1次

相似文献(10条)

1. 会议论文 [郝迎旭](#) 扶正培本治则在肿瘤防治中的研究思路 1999

扶正培本是中医治疗疾病中的一条主要治疗法则. 本文探讨该法治疗肿瘤的理论基础和目前在防治化疗毒副反应并增加化疗疗效和提高生存期等方面的应用.

2. 期刊论文 [史学](#). [郭秀花](#). [祝秀丹](#). [王焕民](#). [秦红](#). [田莉](#). [SHI Xue](#). [GUO Xiu-hua](#). [ZHU Xiu-dan](#). [WANG Huan-min](#). [QIN](#)

[Hong. TIAN Li](#) 扶正健脾法配合化疗对实体瘤患儿生存情况的影响 -[肿瘤研究与临床](#)2009, 21 (3)

目的 探讨中医扶正健脾方法配合化疗治疗实体瘤小儿的远期疗效. 方法 将2005年1月至2006年3月入组的76例实体瘤患儿随机分为治疗组(35例), 对照组(41例). 治疗组采用化疗+自拟扶正健脾中药, 对照组采用单纯化疗. 结果 治疗组患儿的生存率高于对照组, 差异有统计学意义($P=0.0024$). 化疗后平均生存时间治疗组(31 ± 2)个月(95%CI 27~34个月), 对照组(21 ± 2)个月(95%CI 16~25个月), 治疗组高于对照组. 结论 中医辨证论治、扶正健脾、气血双补, 可使患儿体内阴阳气血得以平衡、机体状态比较稳定, 能够顺利完成化疗, 从而使生存期得以延长.

3. 期刊论文 [徐力](#). [XU Li](#) 中药诱导肿瘤细胞凋亡中医机制探析 -[新中医](#)2005, 37 (10)

中药诱导肿瘤细胞凋亡的本质是通过运用中药来调气, 调整人体阴阳之气的偏盛偏衰, 以使癌瘤积聚部位的气机升降出入停止而诱导其消亡.

4. 期刊论文 [赵映前](#). [林家瑞](#). [Zhao Yingqian](#). [Lin Jiarui](#) 前列腺癌的基因研究现状与中医治疗学特点 -[湖北中医学院学报](#)2000, 2 (2)

前列腺癌为西方国家常见肿瘤之一. 近年来中国等东方国家的发病率亦有逐年增高的趋势, 由于其发病原因复杂, 解剖部位特殊, 中西医对之治疗均感到十分棘手. 本文从基因角度探讨了其发病学原理, 主要从原癌基因与抑癌基因及其表达与治疗方面进行了阐述, 进而对中医治疗学特点进行了分析与总结, 旨在对本病的临床研究起到一定的推动作用.

5. 会议论文 [李可](#) 论肿瘤的治疗思路 2008

人身各处, 但凡一处阳气不到便是病. 本文介绍了肿瘤的病因, 分析了治疗方法和思路, 提出攻下之法不可偏废.

6. 期刊论文 [沈自尹](#) 中医药在调节基因平衡上的优势 -[中西医结合学报](#)2003, 1 (1)

细胞增殖与细胞凋亡在生物体内受基因的有序调控, 形成动态平衡, 是机体稳态的要素. 正常细胞的过度增殖会形成肿瘤, 过度凋亡则会走向衰老. 这样肿瘤与衰老之间存在着既是统一又是矛盾的关系. 处理好受基因调控的肿瘤和衰老两者之间的关系, 就可以使人们既能长寿又不易患肿瘤.

7. 会议论文 [王萍](#) 蓄积性心脏毒性反应的中医临床治疗学探讨 2006

肿瘤的临床化学药物治疗是恶性肿瘤的主要治疗手段之一, 尤其是多药的联合化疗方案, 是按肿瘤细胞增殖动力学特点设计安排的联合序贯化疗, 因此, 在现有的化疗药物中绝大多数在抑制生长或杀伤癌细胞的同时, 同样对机体内继续繁殖的正常细胞有毒害作用. 以蒽环类化疗药如阿霉素、罗红霉素等引起蓄积性心脏毒性而导致的心脏病、严重心律失常、心包炎、心肌缺血、心房颤动、心肌梗死、心功能衰竭等临床病症, 西医只能是对症治疗, 而中医药单独应用或与化疗联合应用, 辨病与辨证相结合, 着眼于整体思辨, 常常显示其独特的优势. 能明显地降低和改善患者的心肌毒性症状, 提高了生存质量, 延长了生存时间. 本文将笔者的辨治思路总结如下, 以供同道矫正与借鉴.

8. 会议论文 [闫浩](#) 任督脉在肿瘤治疗中的作用浅探 2001

人之根本在于阴阳, 癌肿必然对任督脉产生影响, 任督二脉运动和功能状态, 不但对脏腑经络有影响, 在癌肿的发生、发展和转移上也有密切联系, 在治疗上也有重要意义, 有必要予以探讨.

9. 会议论文 [孙宏新](#). [孙君](#). [陶志广](#) 周宜强教授治疗食道癌经验 2001

周教授近20年来专攻肿瘤治疗, 尤对消化道肿瘤的治疗颇具心得, 作者侍师临证, 所得颇丰, 现将其治疗食道癌的经验予以介绍.

10. 期刊论文 [张向农](#). [范磊](#). [廖娟](#). [宋宏琳](#). [ZHANG Xiang-nong](#). [FAN Lei](#). [LIAO Juan](#). [SONG Hong-lin](#) 乳腺癌古代中医文献考略 -[肿瘤研究与临床](#)2009, 21 (4)

乳腺癌是女性高发恶性肿瘤. 中医古代文献对于乳腺癌在病因、病机、治则、方药方面都有很深入的认识, 对于现代临床医学有极大的参考价值, 且现代临床试验与动物实验表明, 中西药结合治疗乳腺癌疗效明显优于单纯应用西药组. 现对古代文献中与乳腺癌相关的记载进行梳理, 以期对临床医师提供更开阔的辨治思路.

引证文献(1条)

1. [周俊](#). [王忠鑫](#). [凌昌全](#). [陈群伟](#) 原发性肝癌自发性破裂出血的救治 [期刊论文] -[中国中西医结合急救杂志](#) 2009 (2)

本文链接：http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgzyjhjzz200901026.aspx

授权使用：qkzg16(qkzg16), 授权号：69886b0e-c347-45b1-aa26-9eec010d7288

下载时间：2011年5月23日